

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 22 от 11.06.2025 г.

тел. (861) 224-69-79, e-mail: pfito@mail.ru

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329

Офиоболезная гниль- хозяйственно значимое заболевание на озимой пшенице



В настоящий период при обследовании посевов озимой пшеницы отмечено интенсивное нарастание **офиоболезной гнили (*Ophiobolus graminis* Saccardo)** в виде образования очагов усыхания растений.

Гниль поражает прикорневую часть и корень, они чернеют. Нарушается водный и питательный обмен, растения преждевременного желтеют, усыхают, и появляются признаки белоколосости. В колосьях пораженных растений образуется щуплое зерно. Болезнь имеет хозяйственное значение и при эпифитотии потери урожая достигают 30-40%.



Интенсивно развивается при нарушении севооборота.

Основной источник инфекции почва и зараженные растительные остатки. После уборки озимых патогенный комплекс будет сохраняться, и накапливаться в почве. Эффективной мерой в снижении вредоносности офиоболезной и других видов гнилей: фузариозной, церкоспореллезно-ризоктониозной, гибеллинозной является оздоровление и восстановление полей препаратами деструкторами с обязательным соблюдением всего комплекса агротехнических мероприятий. Сразу после уборки озимых провести **микологический анализ почвы** для определения соотношения патогенной и супрессивной микрофлоры. Для ускорения разложения пожнивных остатков провести опрыскивание полей **препаратом деструктором на основе гриба триходермы Эффект Био** с нормой расхода 2,5-3,5 л/га или др. согласно «Каталогу...». Эффективность применения препаратов деструкторов повысится при длительном внесении на протяжении 3-5 лет.



Телеграм



www.rsc23.ru