

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 58 от 04.08.2026 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппиловская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr@rsc23.ru

ХЛОПКОВАЯ СОВКА



Наблюдается интенсивный лёт бабочек хлопковой совки. Вредитель повреждает более 120 видов растений. В популяции все фазы развития вредителя. Самка совки откладывает яйца на листья и генеративные органы. У кукурузы – на нити початков, метелки и опушенные части стеблей, у сои это бобики, у винограда – сочные ягоды. Яйца бледно-желтоватые, позже зеленоватые, диаметром 0,5-0,6 мм. При жаркой погоде отрождение гусениц происходит на 2-4 день. Вредоносность может достигать 30-70%.

Для мониторинга интенсивности лёта бабочек рекомендуем использовать феромонные ловушки.

Защитные мероприятия проводят по гусеницам младших возрастов при экономическом пороге вредоносности на кукурузе: 1-2 гус./10 раст.; на сое: 1-1,5 гус./10 растений; на подсолнечнике: 2 гус./корзинку; на томатах: 0,5-1 гус./10 раст. препаратами согласно «Реестру...». При проведении защитных мероприятий и высокой эффективности необходим индивидуальный подход к каждому полю, с обязательным чередованием действующих веществ, применяемых инсектицидов

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов». Строго соблюдать регламенты применения препаратов.

www.rsc23.ru