

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 6 от 04.04.2025 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Внесение гербицидов на горохе



Повышенные температуры и наличие влаги способствуют вегетации сорных растений на посевах гороха. Наступают сроки внесения гербицидов. Отмечается активный рост яровых ранних и поздних видов сорняков, а также многолетних и злаковых.

Выбор гербицида зависит от видового состава сорной растительности и степени засоренности. Наиболее эффективны обработки в фазе 3-6 листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков. Также влияет и температурный режим - необходимо использовать препараты в диапазоне 10 - 20°C.

Горох является чувствительной культурой к применению гербицидов, поэтому для снятия пестицидной нагрузки рекомендуем в смесь добавлять препараты на основе гуминовых кислот.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



www.rsc23.ru