

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 63 от 31.10.2024 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Злаковые мухи



На всходах озимых колосовых культур наблюдается лёт **злаковых мух**.

На озимой пшенице вредит вторая генерация **пшеничной мухи**. Обработки против данного вида необходимо проводить до начала откладки яиц в фазе 1,5-2 листа у растения при отлове 6 экз./лов. стаканчик в сутки или более 30 мух/100

взмахов сачка. После откладки яиц обработки не целесообразны. Посевы, вступившие в фазу кущения, повреждаются незначительно.

Муха **опомиза** развивается в одной генерации. Вылетевшие летом мухи, откладывают яйца в осенний период. Отродившиеся личинки способны повреждать несколько побегов и наносить значительный вред, изреживая посевы.

При выявлении мухи **опомизы** обработки рекомендуем проводить по лету при численности свыше 30 экз./100 взмахов сачка. Обработки по личинкам не эффективны.



Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий



Информационный канал
Телеграмм



www.rsc23.ru