

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 11 от 9.04.2026 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппельевская, 329
тел. (861) 224-54-07, 224-59-08, e-mail: stzrbio@mail.ru

Внесение гербицидов на горохе



Наступают сроки внесения гербицидов на горохе. Погодные условия способствуют активной вегетации сорных растений на полях. На ранних стадиях культура роста слабо конкурирует с сорняками, поэтому борьба с ними имеет важное значение. Основными засорителями гороха являются марь белая, горчица полевая, осот розовый, виды щирицы, ромашка и др.

Внесение гербицидов проводят в фазу 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Выбор препарата зависит от видового состава сорной растительности и степени засоренности. Оптимальная температура для внесения гербицидов составляет от 15 до 25°C.

Для предотвращения возникновения стресса у растений от применения гербицидов рекомендуем в рабочую жидкость добавлять препараты на основе гуминовых кислот.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

