

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№42 от 10.06.2026 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-69-79, e-mail: fito@rsc23.ru

ЦЕРКОСПОРОЗ НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ



Проходящие осадки ливневого характера способствуют проявлению **церкоспоровой пятнистости** (*Cercospora beticola* Sacc.) на посевах сахарной свеклы в центральных и северных районах края.

Диагностический признак возбудителя - на листьях образуются округлые светло-бурые пятна, с красноватой или буроватой каймой. Бархатистый серовато-белый налёт на пятнах листа - характерный признак.



Церкоспороз одно из наиболее вредоносных заболеваний листового аппарата сахарной свеклы. При сильном поражении листья засыхают и отмирают, за исключением молодых листьев. Преждевременное массовое отмирание листьев вынуждает растения тратить ресурсы (в том числе накопленный в корнеплодах сахар) на образование новых листьев. Это снижает общую урожайность и сахаристость сахарной свеклы. Такие корнеплоды хуже хранятся — корнеплод поражается гнилями.

Необходимо вести мониторинг посевов и при пораженности церкоспорозом приступить к обработкам системными фунгицидами согласно «Реестру...». Для повышения иммунизации сахарной свеклы к заболеванию и стрессоустойчивости эффективно применять баковую смесь биопрепарата Баксис, Ж с нормой расхода 2,0-5,0 л/га с добавлением Гумата «Здоровый урожай» - 0,4-2,0 л/га.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов».
Строго соблюдать регламенты применения препаратов.



www.rsc23.ru