

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 65 от 30.09.2022 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Подгрызающие совки



На всходах озимого рапса отмечается вредоносность гусениц **подгрызающих совок**. Питание наблюдается вечером и ночью. Одна гусеница за одну ночь может уничтожить 10-15 растений. В дневное время гусеницы подгрызающих совок скрываются на нижней стороне листиков, прилегающих плотно к земле или в верхнем слое почвы. Наиболее опасны повреждения проростков и всходов растений у основания стебля на уровне почвы. При численности, превышающей экономический порог вредоносности (1-3 гус./м²), всходы могут быть полностью уничтожены.

Для борьбы с подгрызающими совками большое значение имеют зяблевая вспашка, междурядные обработки, при которых уничтожаются яйца, гусеницы и куколки совок. При численности выше ЭПВ рекомендовано проводить обработки инсектицидами согласно «Каталогу...». Для достижения максимального эффекта необходимо применять комплекс приёмов, истребительные мероприятия проводить в вечерние часы.

Важно! Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

