

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 66 от 7.10.2026 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr@rsc23.ru

Вредители на озимом рапсе

Погодные условия благоприятны для развития вредителей (блошки, капустная моль, рапсовый пилильщик и др.) на всходах озимого рапса.



Гусеницы **капустной моли** младших возрастов питаются преимущественно на нижней стороне листьев, выгрызая паренхиму листовой пластинки, по мере роста прожорливость их увеличивается, гусеницы старших возрастов держатся на верхней стороне листьев — прогрызают в них сквозные отверстия, обгрызают листья с краёв и могут полностью съедать ткани листьев. Высокая численность вредителей может привести к гибели растений. Защитные мероприятия необходимо провести

при численности вредителя 3-5 экз./раст. и заселении не ниже 10% растений.

Жуки **крестоцветных блошек** соскабливают верхний слой листьев в виде язвочек. При разрастании листьев на них образуются отверстия. Наибольшую опасность блошки представляют в период от появления семядольных листьев до дифференциации первого настоящего листа. При высокой численности блошек может наблюдаться гибель всходов, особенно в условиях засушливой погоды. Защитные мероприятия необходимо провести при численности вредителя 8-10 экз./м².



Ложногусеницы **рапсового пилильщика** выгрызают ткань листовой пластинки. При слабом повреждении листья напоминают сетку со множеством дырочек. При сильном - остаются крупные жилки и черешок. Это приводит к уменьшению фотосинтеза, замедлению роста и развития растений, а впоследствии к потере урожая. Кроме того, поврежденные листья становятся более подвержены инфекционным заболеваниям.

Повреждения вредителями наиболее опасны в начале вегетации растений и могут привести к их гибели. Вредоносность гусениц продлится до устойчивого похолодания. При численности 1-2 экз./раст. и заселении свыше 10% растений необходимо провести защитные мероприятия препаратами согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов».