

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 37 от 26.05.2026 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппельевская, 329
тел. (861) 224-54-07, 224-59-08, e-mail: stzrbio@mail.ru

Внесение гербицидов на посевах сои



Наступили сроки внесения гербицидов на посевах сои. Культура чувствительна к засоренности, на начальных этапах своего роста и развития, поэтому своевременное применение гербицидов – один из основных элементов ее возделывания. Опрыскивание посевов

проводят в фазу 1-3 настоящих листьев у культуры.

Основными сорняками в посевах сои из двудольных сорняков являются: канатник Теофраста, марь белая, виды осотов, щирицы и др.; из злаковых - просо куриное, виды щетинника и др. Оптимально опрыскивание посевов проводить в ранние фазы роста сорных растений: двудольные - 2–4 листа, злаковые — 2–3 листа, многолетние двудольные — в фазе розетки.

Агротехнические мероприятия так же эффективно снижают численность сорняков.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов».

Строго соблюдать регламенты применения препаратов.



www.rsc23.ru