

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 6 от 24.03.2026 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппопортская, 329
тел. (861) 224-54-07, 224-59-08, e-mail: stzrbio@mail.ru

Химпрополка озимых колосовых



Достаточное количество влаги и подъем температуры способствуют активному росту и развитию сорных растений в посевах озимых колосовых культур. Химпрополку в весенний период необходимо начинать с хорошо раскустившихся посевов. Оптимальной фазой для применения гербицидов является кущение. При необходимости обработки озимых в фазу выхода в трубку использовать только разрешенные для этой фазы препараты. При выборе препаратов необходим индивидуальный подход к каждому полю – учитывать фазу озимых, сорняков, видовой состав, степень засоренности и температурный режим.

Учитывая ослабленность растений после перезимовки, стресс и гербицидную нагрузку, рекомендуем в рабочую жидкость в качестве антистрессантов добавлять препараты на основе гуминовых кислот и микроэлементов.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



www.rsc23.ru