

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 3 от 16.03.2026 г.

тел. (861) 224-69-79, e-mail: pfito@mail.ru

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппельбергская, 329

Курчавость листьев персика

С наступлением тёплых весенних дней наступает важная и ответственная задача — защита урожая от коварной болезни, известной как курчавость листьев персика. Это грибковое заболевание, вызываемое патогеном *Taphrina deformans*, способно не только испортить внешний вид деревьев, но и значительно снизить плодоношение, а в запущенных случаях — привести к гибели молодых побегов. Своевременное начало профилактических и лечебных мероприятий становится ключевым фактором для сохранения здоровья персиковых насаждений.



Первые признаки заболевания проявляются на молодых, только что развернувшихся листочках. Они начинают деформироваться, приобретая красновато-пурпурный оттенок, их поверхность становится морщинистой и пузырчатой. Со временем поражённые листья скручиваются, желтеют и преждевременно опадают. Эта потеря листвы ослабляет дерево, лишает его возможности нормально фотосинтезировать и закладывать плодовые почки на следующий год.

Важно понимать, что борьба с курчавостью листьев персика — это комплексный процесс, требующий регулярности и правильного выбора препаратов. Существует несколько этапов, когда обработки наиболее эффективны. Первый и, пожалуй, самый важный — это до распускания почек.

В настоящий период для профилактики и снижения вредоносности курчавости листьев, особенно на восприимчивых сортах, необходимо провести опрыскивание деревьев медьсодержащими и системными фунгицидами согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов».

