


СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 29 от 19.05.2026 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппельевская, 329
тел. (861) 224-54-07, 224-59-08, e-mail: stzrbio@mail.ru

Обработка кукурузы гербицидами



Наступают сроки проведения химпрополки на посевах кукурузы. Наиболее эффективно проводить опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений - 2-6 листьев у однолетних двудольных и 1-3 листа у однолетних злаковых сорняков.

Многолетние виды уязвимы в фазу розетки двудольных и при высоте 10-15 см злаковых сорняков. Основные засорители культуры: марь белая, канатник Теофраста, сурепка обыкновенная, виды щирицы, бодяк полевой, вьюнок полевой, ежовник обыкновенный, виды щетинника, росички и др. Для снятия пестицидной нагрузки рекомендуем добавлять препараты на основе гуминовых кислот.

Применение послевсходовых гербицидов в сочетании с агротехническими мероприятиями наиболее эффективно уничтожают сорняки.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов». Строго соблюдать регламенты применения препаратов.

