

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 5 от 3.04.2025 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Рапсовый цветоед, рапсовый скрытнохоботник

На посевах озимого рапса, вступивших в фазу бутонизации, идёт заселение рапсовым цветоедом, скрытнохоботником.



Жуки рапсового цветоеда повреждают пыльники и другие части цветов рапса и прочих дикорастущих и культурных крестоцветных. Самки откладывают внутрь цветков яйца. Через 8-14 дней отрождаются личинки, которые питаются пыльцой. Повреждения рапсовым цветоедом приводит к снижению урожая семян.

Скрытнохоботник рапсовый повреждает вегетативные и генеративные органы, семена крестоцветных культур. Основной вред наносят личинки.

В настоящее время необходимо выявить и обработать посевы с численностью превышающей экономический порог вредоносности рапсового цветоеда -2-3 экз./растение, рапсового скрытнохоботника-1-2 экз./растение, препаратами согласно «Каталогу...».



Следует учитывать, что рапс в период цветения привлекает много полезных насекомых и медоносных пчел, поэтому необходимо заблаговременно предупредить пчеловодов.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



www.rsc23.ru