

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 10 от 31.03.2026 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппопортская, 329
тел. (861) 224-69-79, e-mail: fito@rsc23.ru

ВНИМАНИЕ! Гибеллиноз на посевах озимых

В настоящее время в ряде районов северной и центральной зонах края на отдельных полях озимой пшеницы отмечается развитие **гибеллинозной прикорневой гнили** (*Gibellina cerealis*), интенсивнее по предшественникам подсолнечник, многолетние травы, горох.

Гибеллиноз очень опасное заболевание, вызывает прямые потери урожая:

- отмирание растений (выпады),
- снижение коэффициента кущения,
- ломкость стеблей (полегание),
- отсутствие зерновок в колосе либо щуплые зерновки,
- снижение количества и качества зерна.


После уборки патоген будет сохраняться, и накапливаться в поверхностных слоях почвы на зараженных растительных остатках.

Обработки фунгицидами и протравливание семенного материала не эффективны.

Стратегией в снижении вредоносности гибеллиноза остается повышение супрессивности почвы путем ее оздоровления. Проведение микологического анализа почвы покажет степень патогенности и супрессивности. На основании этого будут рекомендованы оздоровительные мероприятия пораженного поля и восстановления полезной микрофлоры.

В настоящий период необходимо вести мониторинг озимых колосовых культур. Поля, пораженные гибеллинозом, взять под контроль.

Для повышения иммунизации озимой пшеницы к заболеванию и активного физиологического роста растений рекомендуем провести обработки посевов комбинированной биологизированной смесью: **БАКСИС, Ж с нормой расхода 1 л/га + Гумат «Здоровый урожай» - 1л/га + Азолен, Ж -1 л/га** и др. согласно «Реестру...».



Лист пораженный
гибеллинозом

