

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 19 от 15.05.2025 г.

тел. (861) 224-69-79, e-mail: pfito@mail.ru

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппельтская, 329

Отмечена пыльная головня на озимом ячмене

Мониторинг посевов озимого ячменя показывает единичное проявление **пыльной головни**. Заболевание передается зараженными семенами. Поражение происходит в поле во время цветения, споры гриба проникают в зародыш семени. Инфекция сохраняется внутри зародыша мицелием до посева и в течение 3-х лет не теряет своего патогенного потенциала.



Болезнь вредоносна, особенно на семенных участках. Пораженные растения резко снижают качество зерна и выполненность колоса.

Пыльная головня ячменя (возбудитель - *Ustilago nuda*) хорошо определяется в поле, в виде черных порошащих больных колосьев, появляющиеся во время цветения. В пораженном колосе разрушаются все части, кроме стержня (чешуйки, ости, завязь) и превращаются в черную пылящую массу телиоспор. Урожай и качество зерна сильно снижается.

Снижают пораженность растений:

- высев районированных сортов;
- сбор семян только со здоровых посевов;
- соблюдение севооборота, сроков сева;
- апробация семенных участков;
- заблаговременное обеззараживание семян протравителями согласно «Каталогу...»;
- определение качества протравливания семенного материала;
- контроль за проявлением болезни на посевах озимых колосовых культур.



Телеграм



www.rsc23.ru