

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 5 от 24.03.2026 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппельевская, 329
тел. (861) 224-54-07, 224-59-08, e-mail: stzrbio@mail.ru

Почвенные гербициды на пропашно-технических культурах



Перед севом подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, на полях где существует опасность сильного засорения однолетними злаковыми и двудольными сорняками, необходимо применять почвенные гербициды.

Опрыскивание почвы необходимо проводить до посева или после посева до появления всходов культуры. Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора — не менее 200 л/га. Это обеспечивает равномерное покрытие поверхности почвы и формирование качественного гербицидного экрана, от которого сорные растения погибают ещё на этапе всходов. Почвенные гербициды эффективны против видов щетинника и щириц, мари белой, проса куриного, паслена черного, росички и др.

Для борьбы с многолетними видами сорняков до посева или до всходов культуры целесообразно применение глифосатов.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

