

## СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 35 от 06.06.2023 г.

тел. (861) 224-69-79, e-mail: pfito@mail.ru

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329

### Фитофтороз картофеля

Сложившиеся погодные условия привели к интенсивному нарастанию фитофтороза на листьях картофеля. Развитию заболевания способствуют постоянные осадки и прохладные ночи.



Фитофтороз картофеля *Phytophthora infestans* - одно из самых вредоносных грибных заболеваний на протяжении всего периода выращивания. Урожай снижается на 70% и более. Поражаются листья, стебли, клубни. На листьях и стеблях, появляются быстро увеличивающиеся тёмно-бурые пятна с налетом гриба на нижней стороне листа. При интенсивном поражении растения могут быстро усыхать. На больных клубнях обозначаются резко очерченные сероватые, а затем бурые вдавленные твёрдые пятна различного размера. На разрезе клубня, под пятном, видны некрозы ржавого цвета, распространяющиеся внутрь клубня в виде язычков или клиньев.

Зараженные клубни – основной источник инфекции.

Меры, снижающие вредоносность фитофтороза:

- ✓ выращивание толерантных сортов
- ✓ севооборот
- ✓ клубневой анализ и обработка клубней перед посадкой протравителями согласно «Каталогу...»
- ✓ для уничтожения больных растительных остатков в почве необходимо внесение препаратов-деструкторов на основе гриба триходерма ЭФФЕКТ БИО, СК с нормой расхода 2,5 л/га или микробиологическим удобрением Восток ЭМ-1- 4-6 л/га и др. согласно «Каталогу...».
- ✓ своевременные обработки и соблюдение системы защитных мероприятий фунгицидами и удобрениями с микроэлементами.



Информационный канал  
Телеграмм



[www.rsc23.ru](http://www.rsc23.ru)