

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 27 от 24.07.2025 г.

тел. (861) 224-69-79 e-mail: Pfito@mail.ru

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329

СУХАЯ ГНИЛЬ НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ



Аномальная сушь и жара способствует заражению корзинок скороспелых сортов и гибридов **сухой гнилью**. Фитоситуация усугубляется в связи с повреждением корзинок вредителями- растительноядными клопами, хлопковой совкой и др. На корзинках появляются размягчённые пятна темно-коричневого цвета с интенсивным налетом гриба, мицелий проникает на лицевую часть корзинки и между семянками. В отличие от белой гнили, склеротии не образуются.

Сухая гниль - одно из опасных заболеваний в нашем регионе. Вредоносность ее ведёт к значительному снижению урожайности и качественных показателей семян. Необходимо выявлять пораженные посевы и, учитывая температурный режим, проводить своевременную защиту подсолнечника инсектицидами и фунгицидами согласно «Каталогу», уделяя особое внимание семенным участкам.

Основной источник инфекции, зараженные послеуборочные остатки и семена в почве. Для снижения патогенного запаса ризопуса и др. заболеваний необходимо проводить обработку почвы препаратами деструкторами ЭФФЕКТ БИО, 2,5-3,5 л/га и др. согласно «Каталогу...». Мероприятие эффективно при ежегодном применении деструкторов на протяжении 3-5 лет.

ВАЖНО! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве должно проводиться только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

