

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 62 от 17.08.2026 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr@rsc23.ru

КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП



В настоящее время отмечается развитие **личинок второй генерации** коричнево-мраморного клопа (КМК). Личинки обладают яркой окраской, что хорошо выделяет их на фоне листвы. С возрастом окрас сменяется на черный. Самка способна дать потомство до 300 яиц, полный цикл при благоприятных температурных условиях длится около 40–50 суток.

КМК относится к опасным карантинным объектам и наносит вред плодовым, овощным, пропашным и техническим культурам, а также винограду. Наиболее эффективны обработки по клопу на стадии личинки, эта фаза является наиболее уязвимой для вредителя. Работы необходимо проводить утром или вечером в часы пиковой активности насекомых инсектицидами согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов».

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов».
Строго соблюдать регламенты применения препаратов.



www.rsc23.ru