

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 38 от 4.07.2025 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Стеблевой мотылек



На посевах кукурузы отмечается вредоносность стеблевого мотылька. Отродившиеся гусеницы проникают внутрь стеблей растений, прокладывая в них ходы. В стеблях видны отверстия с высыпавшимися экскрементами. Гусеницы могут мигрировать и переселяться с одного растения на другое, повреждая метелки и початки, вызывая ломкость стеблей, снижение урожайности зеленой массы и семян, способствуют пораженности гнилями (фузариоз) и плесневением.

Очаги вредоносности будут наблюдаться на более увлажненных местах, проходящие осадки будут способствовать размножению вредителя.

Защитные мероприятия необходимо проводить при заселении 8% растений с кладками яиц в фазу 6-8 листьев или при численности 1-2 гус. /раст. после выметывания метелок препаратами согласно «Каталогу...».

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий. Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



www.rsc23.ru