



СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 38 от 26.05.2026 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппиловская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr@rsc23.ru

Тля на горохе



В настоящее время отмечается заселение посевов гороха тлём. Интенсивность размножения определяется погодными условиями. Массовому размножению вредителя способствует погода с умеренной температурой (+17-21⁰С) и повышенной влажностью, когда вегетация растений более продолжительна, а период питания вредителя растянут.

Наибольший вред тли наносят в период бутонизации - начало цветения гороха. Тля питается соками растений, снижая темпы роста, уменьшает количество цветков и плодов, а также повышает уязвимость к болезням. Особенно страдают верхушки побегов, почки и завязи. Повреждённые растения испытывают дефицит питания. При высокой численности вредителя задерживается рост стеблей, образуется меньше цветков, бобов, зерен в бобах; уменьшается вес зерна.

Кроме непосредственного вреда, гороховая тля способствует распространению вирусных болезней.

Защитные мероприятия рекомендовано проводить после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий при превышении экономического порога вредоносности – 10-15 экз./растение, 15% заселенных растений.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов».

Строго соблюдать регламенты применения препаратов.

