

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 44 от 02.10.2025 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329

тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Стеблевой кукурузный мотылек



Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю обращают внимание, что выявляются поля с заселенностью стеблевым кукурузным мотыльком.

Ко времени уборки кукурузы гусеницы находятся в нижней части стебля и большая часть их после уборки остается в стерне кукурузы. С похолоданием гусеницы прекращают питание и переходят в состояние диапаузы.

Для снижения зимующего запаса рекомендуем проведение комплекса агротехнических мероприятий, включающих тщательную уборку с уничтожением растительных остатков, в которых зимуют гусеницы; глубокую зяблевую вспашку участков, где были выявлены повреждения. Гусеницы при запашке погибают вследствие лишения их частей растений, пригодных для их перезимовки.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий



Информационный канал
Телеграмм



www.rsc23.ru