

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 23 от 21.05.2026 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппопортская, 329
тел. (861) 224-69-79, e-mail: fito@rsc23.ru

Офиоблезная и ризоктониозная гнили на посевах озимых колосовых культур



Проходящие на большей части территории края ливневые осадки, и повышенные температуры воздуха способствуют поражению озимых **офиоблезной и ризоктониозной гнилями**. Болезни отмечаются в некоторых хозяйствах центральной зоны края.

Гнили поражают прикорневую часть растения и корень. **Офиоблезная** - с признаками черного налета; **ризоктониозная** - глазчатой пятнистостью. Нарушается водный и питательный обмен, растения желтеют, усыхают, и появляются белоколосость или усыхание. Более интенсивно по полупаровому предшественнику.



В настоящий период необходимо вести мониторинг посевов на пораженность офиоблезом и ризоктониозом.

После уборки озимых патогенная инфекция будет сохраняться, и накапливаться в почве на зараженных растительных остатках.



Пораженные поля взять под контроль, после уборки культуры рекомендуем провести оценку супрессивности почвы путем проведения микологического анализа, который поможет определить разнообразие и численность патогенных грибов на полях озимых.

