

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 36 от 26.05.2026 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппельбергская, 329
тел. (861) 224-54-07, 224-59-08, e-mail: stzrbio@mail.ru

Обработка гербицидами подсолнечника



Наступили сроки внесения гербицидов на подсолнечнике. На сегодняшний день используются три производственные технологии возделывания культуры: классический, подсолнечник, устойчивый к трибенурон – метилу и подсолнечник, устойчивый к имидазолинонам. Каждая из этих технологий решает свои задачи и зависит в первую очередь от видового состава сорняков на поле. Максимальная эффективность гербицидов достигается применением в оптимальную фазу развития сорняков – 2- 4 листа и 4 – 6 настоящих листьев у подсолнечника. Основными сорняками в посеве являются: из двудольных видов - виды мари, осот огородный, паслен черный, канатник Теофраста; из злаковых - овсюг обыкновенный, пырей, гудай и др.

Кроме того, междурядные культивации являются эффективным способом уничтожения сорной растительности.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов».

Строго соблюдать регламенты применения препаратов.



www.rsc23.ru