

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 22 от 15.05.2025 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппельевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Обработка кукурузы гербицидами

Наступили сроки проведения химпрополки на посевах кукурузы. Основными



сорняками в посевах из однолетних видов являются: марь белая, канатник Теофраста, виды щирицы, сурепка обыкновенная и др., из многолетних видов - бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой и др. Из злаковых видов преобладают ежовник обыкновенный, виды щетинника, росички и др.

Наиболее чувствительны к действию гербицидов сорняки в ранние фазы роста - 2-6 листьев у однолетних двудольных и 1-3 листа у однолетних злаковых сорняков. Многолетние виды уязвимы в фазу розетки двудольных и при высоте 10-15 см злаковых сорняков. Оптимальная фаза развития кукурузы для проведения химпрополки 3-5 листьев. Для снятия пестицидной нагрузки рекомендуем добавлять в смесь препараты на основе гуминовых кислот. На посевах пострадавших от «холодного» стресса проводить обработки микробиологическим удобрением Азолен, Ж.

Применение гербицидов в сочетании с агротехническими мероприятиями наиболее эффективно уничтожают сорняки.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

