

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 56 от 21.07.2026 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппиловская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr@rsc23.ru

ХЛОПКОВАЯ СОВКА



В настоящее время наблюдается массовая откладка яиц, отрождение гусениц второго поколения хлопковой совки. Наблюдаются гусеницы всех возрастов. Хлопковая совка – это опасный многоядный вредитель, который повреждает более 120 видов культурных и сорных растений. Бабочки откладывают яйца на листья и генеративные органы, у кукурузы – на нити початков, а затем проникают под обертку и выедают зерна в стадии молочной и восковой спелости, у подсолнечника – на цветоносы,

гусеницы скелетируют листья, но главный вред наносят, выедая семянки в корзинках.

Общий признак – наличие крупных зеленовато-бурых экскрементов в местах питания — верный признак присутствия гусениц старших возрастов. Гусеницы старших возрастов выедают в листьях отверстия, оставляя только крупные жилки, повреждая как вегетативные, так и генеративные части растений.

Для мониторинга рекомендуется использовать феромонные ловушки, при повышении ЭПВ (томаты/перец – 0,3-1 гус./10 раст.; кукуруза – 1-2 гус./10 растений; подсолнечник – 2 гус./ корзинку; соя – 1-1,5 гус./10 растений; виноград – 1 гус./куст)

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только согласно «Реестру пестицидов и агрохимикатов». Строго соблюдать регламенты применения препаратов.

