

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 21 от 15.05.2025 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Тля на горохе



В настоящее время отмечается заселение посевов зимующего и ярового гороха тлёй. Быстрота размножения определяется погодными условиями. Массовому размножению вредителя способствует погода с умеренной температурой (+17-21°C) и повышенной влажностью, когда вегетация растений более продолжительна, а период питания вредителя растянут.

Наибольший вред тли наносят в период бутонизации - начало цветения гороха. При высокой численности вредителя задерживается рост стеблей, образуется меньше цветков, бобов, зерен в бобах; уменьшается вес зерна.

Кроме непосредственного вреда, гороховая тля способствует распространению вирусных болезней.

Защитные мероприятия рекомендовано проводить препаратами согласно «Каталогу...» только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий при превышении экономического порога вредоносности – 10-15 экз./растение, 15% заселенных растений.

Важно! Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

