

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 12 от 22.04.2025 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашиповская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Клоп вредная черепашка



В настоящее время отмечается выход самцов клопа вредная черепашка из мест зимовки и заселение посевов озимых колосовых культур. Вредитель относится к числу особо опасных, карантинных для стран импортёров российского зерна.

Первыми на посевах появляются самцы, самки вылетают на 1-3 дня позже. После перелета на посевы озимых колосовых культур взрослые клопы приступают к питанию, прокалывая хоботком основание стебля. Эти уколы в фазу выхода в трубку вызывают гибель центрального листа и отмирание поврежденного стебля. Позже уколы клопа в стебель и колос вызывают частичную или полную белоколосость. Повреждения взрослыми клопами при высокой численности могут вызвать гибель от 10 до 40 % стеблей.

Учёт численности клопа вредная черепашка проводится кошением энтомологическим сачком. При выявлении 2-4 экз./м² имаго клопов на посевах необходимо провести защитные мероприятия препаратами согласно «Каталогу...».

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



www.rsc23.ru