

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА


№ 26 от 10.06.2026 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-69-79, e-mail: fito@rsc23.ru

Офиоболезная гниль на озимых

Повышенные температуры воздуха, обильное количество влаги, особенно на подтопляемых участках создают угрозу интенсивного нарастания офиоболезной гнили на посевах озимой пшеницы и озимого ячменя в виде больших очагов белоколосости.



В настоящий период необходимо выявить зараженные посевы и после уборки провести диагностику биотенноза почвы на супрессивность и оздоровительные мероприятия.

Для оценки супрессивности почвы сделать **почвенный микологический анализ**, который поможет определить разнообразие и нагрузку патогенных и супрессивных грибов, позволит сформировать комплекс оздоровительных мероприятий для повышения плодородия почв и улучшения фитосанитарного состояния посевов.

Основным источником накопления инфекции являются зараженные послеуборочные остатки и почва.

Поэтому главными агроприемами в снижении вредоносности офиоболезной и др. гнилей остаются:

- соблюдение севооборота, исключить колосовой предшественник;
- запахивание послеуборочных остатков;
- поддерживание и повышение супрессивности и почвенного плодородия;
- внесение сбалансированных доз минеральных удоб-

рений.

